

Употребление спиртного до 21 года - увеличивает риск развития алкоголизма в 4 раза!


ВНИМАНИЕ!

Первые симптомы алкогольного разрушения:

- ты пьёшь, потому что у тебя есть проблемы
- ты пьёшь, потому что друзья, родственники пьют
- ты пьёшь, потому что это модно и по-взрослому
- ты пьёшь, а наутро ощущаешь горечь во рту
- ты пьёшь, потому что считаешь, что это поможет уйти от конфликта и снять стресс
- ты пьёшь, потому что доза алкоголя помогает чувствовать себя спокойнее, раскрепощеннее
- ты пьёшь и получаешь провалы в памяти
- ты пьёшь и попадаешь в неприятности
- ты пьёшь...

ЛЮБОЙ, КТО ПЬЁТ, МОЖЕТ СТАТЬ АЛКОГОЛИКОМ!

РЕШАЙ СЕГОДНЯ, КАКИМ ТЫ БУДЕШЬ ЗАВТРА НЕ ПЕЙ!



КАК СКАЗАТЬ «НЕТ»

Ты всегда можешь сказать «нет», если ты хочешь:

- иметь привлекательную внешность
- быть успешным в жизни
- сохранить хорошие отношения с родными и близкими
- сохранить своё здоровье

Вот некоторые варианты отказа:

1. Назови причину отказа, например, «Я знаю, что это опасно для здоровья», «Я уже пробовавал и мне не понравилось», «Мне это не интересно», «У меня другие планы на сегодня».
2. Можешь просто сказать «НЕТ». Ты не обязан всем объяснять причины.
3. Имей интересное, увлекательное дело. Если ты занят, то это уже причина отказа.
4. Иногда сверстники могут оказывать сильное давление заставляя употреблять алкоголь. Постарайся действовать уверенно и сохраняй твердость в принятии своего решения. Ты можешь сказать: «Нет. Больше меня не уговаривайте», «Мне нужно уйти». Потом просто уйди.
5. Дружи с теми, кто не употребляет алкоголь. Твои настоящие друзья не будут заставлять тебя пить спиртное и не станут делать этого сами.

ГОБУЗ

«ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ»

Великий Новгород

АЛКОГОЛЬ



Мифы....

Реальность....

Последствия....

ЧТО ТАКОЕ АЛКОГОЛЬ?

Алкоголь (этиловый спирт) - это химическое вещество, которое попадая внутрь организма, оказывает токсическое отравляющее действие.

Алкогольные напитки - это спиртосодержащие напитки. К ним относятся, наряду с крепкими спиртными напитками, и легкие, такие как пиво, джин-тоник, алкогольные коктейли.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ ОБ АЛКОГОЛЕ

МИФ №1 Алкоголь - успокоительное средство.

Реальность

После принятия алкоголя можно на короткое время отвлечься от проблем и забот. Однако проблемы и заботы от этого не разрушаются и не исчезают. Даже если увеличить дозу выпиваемого в соответствии с количеством и размером неприятностей. Протрезвев, снова приходится возвращаться к ним с чувством ещё большего напряжения и беспокойства. Более того, если не заниматься решением сложных вопросов, проблемы накапливаются и усиливаются.

СЛАДКОЕ НАЧАЛО... ГОРЬКОГО КОНЦА...



МИФ №2 Алкоголь - хорошее средство для развития общительности.

Реальность

Есть мнение, что алкоголь способен облегчить общение с окружающими, избавить от комплексов, добавить смелости или остроумия. На самом деле - в нетрезвом состоянии редко кто способен адекватно оценивать свои поступки. Поэтому окружающие видят совсем не то, что хотелось бы нам. Смелость может оказаться рискованной, опасной или противозаконной затеей. «Душа компании» будет выглядеть в глазах окружающих нелепым, грубым или вульгарным. **Неоправданные случайные половые связи в состоянии опьянения повышают риск заболеть сифилисом, гонореей, ВИЧ-инфекцией и могут вызвать депрессию и чувство вины за случившееся.**

Причем, в одной банке пива, джин-тоники или коктейля содержится столько же алкоголя, как в 100гр. водки.

Как действует алкоголь на организм?

Алкоголь оказывает токсическое действие, вызывая опьянение. Но за то приходится платить снижением памяти, ухудшением зрения, расстройством координации движений. Алкоголь ослабляет сердечную мышцу, увеличивает печень, разрушает желудок.

ОНИ СЧИТАЮТ СЕБЯ «КРУТЫМИ». А ВЫ?



МИФ №3 Алкоголь - снотворное.

Реальность

Сон после употребления алкоголя наступает в результате токсического воздействия на мозг человека (алкогольное отравление). Сон в этот период не является естественным. Организм во время такого сна полноценно не отдыхает.

МИФ №4 Алкоголь - продукт питания.

Реальность

Алкоголь содержит некоторое количество калорий - в 1гр. около 7 ккал. Однако это так называемые «пустые» калории. Алкоголь не заменяет необходимые для организма питательные вещества и препятствует усвоению витаминов и микроэлементов. Более того, из-за своей токсичности он не позволяет делать организму энергетические запасы.

Алкоголь воздействует на психику и поведение человека. В результате пьянства человек становится агрессивным, подвержен депрессии и снижению интеллекта.

Систематическое употребление алкоголя приводит к психологической и физической зависимости-АЛКОГОЛИЗМУ.

МИФ №5 Алкоголь является средством для согревания.

Реальность

Действительно, в первый момент после употребления алкоголя подкожные сосуды расширяются, в результате чего возникает ощущение разливающегося по телу тепла. Вместе с тем, расширенные кровеносные сосуды усиливают теплообмен и в дальнейшем происходит активная отдача тепла: организм переохлаждается. Так наступает смерть у пьяных людей в холодное время года.



АЛКОГОЛИЗМ — это хроническое заболевание, характеризующееся болезненным пристрастием к употреблению алкоголя, в результате которого происходит необратимое повреждение головного мозга и внутренних органов. А самое главное - человек разрушается как личность.



ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ УПОТРЕБЛЕНИИ АЛКОГОЛЯ

МОЖЕШЬ
ТОЛЬКО
ТЫ!
ДАТЬ
ШАНС
ЗДОРОВЬЮ!

www.takzdorovo.ru

Вино, пиво, ликёр, коньяк, водка. Всё это и многое другое — вполне легальные в нашей стране пищевые продукты. С одной, но очень неприятной особенностью: злоупотребление этими напитками может привести к формированию зависимости — алкоголизму.



Как избежать столкновения с этой проблемой? Достаточно подойти к употреблению спиртных напитков ответственно. Что это значит? Ниже даны 10 ответов на этот вопрос.

Во многих культурах спиртные напитки употребляются только во время приёма пищи, чтобы избежать быстрого опьянения

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД

1. Знать свою границу

Пейте так, чтобы не терять над собой контроль, не напиваться «до поросычьего визга». Как правило, «своя норма» определяется достаточно быстро опытным путём. Не превышайте её, не делайте опьянение своей единственной целью.

2. Закусывайте

Белковая пища (мясо, рыба, сыры) замедляет всасывание алкоголя в кровь, не давая быстро «дойти до

кондиции». Во многих культурах спиртные напитки употребляются только во время приёма пищи, чтобы избежать быстрого опьянения.

3. Не пейте залпом

Всасывание алкоголя начинается уже в ротовой полости, а кроме того, небольшие дозы, даже растянутые по времени, быстрее обезвреживаются печенью.



Об ответственном употреблении алкоголя

4. Пейте только тогда, когда Вы действительно хотите выпить

Не соглашайтесь выпить просто «за компанию», если чувствуете, что у Вас сегодня нет для этого настроения или желания. Если Вы вынуждены присутствовать на застолье, можно ограничиться безалкогольными напитками или разведёнными алкогольными (лёд, сок и т.п.)

5. Выбирайте качество, а не количество

Изучайте известные винодельческие регионы и марки, выясняйте, с какими блюдами сочетаются или не сочетаются те или иные напитки. Это позволит сделать алкоголь второстепенным участником стола, зависящим от подаваемых блюд.

6. Не пейте рюмку за рюмкой

Во время застолья не обязательно осушать до дна Ваш бокал или рюмку после каждого нового тоста. Если Вы чувствуете, что Вам уже достаточно, можно просто пригубить напиток.

7. Если выпили — не садитесь за руль

Вызовите такси или попросите непивших друзей довезти Вас. Алкоголь, даже в очень небольших дозах, сильно затормаживает реакцию и снижает способность быстро принимать решения.

8. Остерегайтесь экспериментов с неизвестными напитками

Если Вы не знаете, как на Вас действует ром или текила, знакомство с ними лучше начинать с минимальных доз. Также лучше отказаться от напитков сомнительного качества или происхождения, не уподобляйтесь лабораторным мышам.

9. Не смешивайте алкоголь и лекарства

Откажитесь от спиртного, если Вы принимаете лекарства, особенно антидепрессанты и антибиотики. Их комбинация с алкоголем может привести к самым непредсказуемым последствиям.

10. Уважайте права людей, которые отказываются от спиртного

Это их выбор, независимо от того, по каким соображениям они это делают — религиозным, медицинским или каким-то другим.

ФОРМИРОВАНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ*

При безответственном подходе к употреблению спиртного может развиться алкогольная зависимость — алкоголизм. Медицина пока не в состоянии точно предсказать, что вот у этого человека болезнь разовьётся, а у этого — нет, поэтому первому пить нельзя, а второму можно.



Алкоголизм — болезнь, за возникновение, течение и исход которой полную ответственность несёт сам больной



Излечить от алкоголизма нельзя, можно только вывести человека в стойкую ремиссию

Алкоголизм — болезнь, за возникновение, течение и исход которой полную ответственность несёт сам больной.

Зависимость не возникает на пустом месте. Для её формирования необходимо регулярное злоупотребление спиртным. Сколько времени должно пройти, чтобы человек спился — сказать сложно. Описаны случаи, когда было достаточно и 3 месяцев. И выяснить это можно, только ставя добровольные рискованные эксперименты на себе.

Но вот группы риска медики определять научились:

1. «Алкогольная» наследственность. У выходца из пьющей семьи в 7 раз выше риск формирования алкоголизма, чем у потомства непьющих родителей.

2. Лица с неустойчивой психикой.

3. Перенесшие травмы головы (сотрясения, ушибы мозга и т.п.)

4. Страдающие хроническими заболеваниями печени.

Сначала формируется психологическая зависимость от спиртного. Алкоголь превращается в единственный способ «снятия стресса» или «поднятия настроения». Как только для достижения прежнего опьяняющего эффекта приходится постепенно увеличивать дозу — всё, процесс привыкания пошёл полным ходом.

Если продолжать издевательства над организмом, ломается энергетический обмен. Наше основное «топливо» — это глюкоза. Но этиловый спирт в смысле выхода энергии почти в два раза эффективнее. Происходит перестройка всех биохимических реакций на «спиртовые» рельсы. Так возникает физическая зависимость.

Этот процесс течёт только в одну сторону, чтобы вернуться обратно к глюкозе, организму придётся пройти через самую настоящую «ломку», которая бывает у наркоманов.

И в последующем даже 20–30 граммов спиртного моментально переключат «стрелки» обратно на этиловый спирт. Именно поэтому диагноз «алкоголизм» ставится пожизненно. Излечить от алкоголизма нельзя, можно лишь вывести человека в стойкую ремиссию,

которая сохранится только при полном и безоговорочном отказе от спиртного.

Так стоит ли доводить до таких крайностей?

КАК РАСПОЗНАТЬ НАЧИНАЮЩИЙСЯ АЛКОГОЛИЗМ?

КРИТЕРИЙ ПЕРВЫЙ. Симптом желательности алкоголизации.

Второе название — «сосредоточенность на выпивке». Этот симптом проявляется в виде фиксации на теме алкоголизации. Мысли о спиртном выходят на первый план.

Любое событие в жизни рассматривается как повод **«сбить это дело»**: день рождения очередного сотрудника, встреча с приятелем, получение аванса, зарплата, премии. Позже поводом становится просто наличие денег и свободного времени.

Что бы человек ни делал, всё напоминает ему о выпивке и рождает мысль **«а неплохо бы сейчас хлопнуть по рюмашке»**. Подготовка к любому алкогольному эпизоду производится тщательно, можно даже сказать, **«с любовью»**.

При виде бутылки можно заметить у зависимого человека признаки оживления, усиления моторики, некоторое возбуждение, блеск

в глазах, приподнятое настроение. В особо выраженных случаях — до эйфории и некоторых признаков опьянения (*это мозг вспоминает привычное состояние*). И отвлечься от таких мыслей очень тяжело, приходится прилагать немалые усилия.

Мысли и желательности алкоголизации становятся навязчивыми, что свидетельствует о формировании патологического влечения (*обсессии*), а, значит, о наличии первой стадии алкоголизма.

КРИТЕРИЙ ВТОРОЙ. Феномен запаздывающего насыщения.

Пока речь идёт о пьянстве, потребление алкоголя всё-таки ограничивается некоторыми социально приемлемыми рамками. В основном, понятное дело, групповыми. Как и в случае со всей остальной пищей, для спиртных напитков характерно состояние насыщения, когда желаемый эффект достигнут, больше пить не требуется.

Но чем больше человек пьёт, тем больше запаздывает это самое насыщение. Ощущение **«полного бака»** возникает только от значительных количеств алкоголя, иногда настолько значительных, что они превышают предел биологической переносимости. То есть насыщения у алкоголика практически не наступает, а теоретически достаточные дозы лежат где-то в районе алкогольной комы.



«всегда готов». К выпивке и опьянению. Особенно ярко этот феномен проявляется при внезапной отмене намечавшегося застолья, что воспринимается алкоголем зависимым как личная трагедия. Он пытается всячески исправить ситуацию — изменить место, время, состав, придумать повод для отсутствия дома или на работе. Границей заболевания следует считать момент, когда начавшиеся приготовления обязательно доводятся до конца в любой ситуации, без исключений, то есть, когда происходит утрата ситуационного контроля.

КРИТЕРИЙ ТРЕТИЙ. Снижение способности к градуальным реакциям.

За этим не очень понятным термином скрывается способность реагировать на внешние раздражители в достаточном широком спектре, в множестве «оттенков серого». Алкоголик переходит на реакцию «всё или ничего». Количество алкоголя обязательно должно быть достаточным для полного удовлетворения потребности в нём. И только так. А это не всегда возможно. Соответственно, опьянение теряет эйфорический компонент и приобретает обратный, дисфорический.

КРИТЕРИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ. Затруднение при отказе от выпивки.

Чаще всего проявляется, если человек случайно попадает в компанию, где выпивают. Он откладывает все дела только для того, чтобы поучаствовать. Его состояние можно выразить девизом

КРИТЕРИЙ ПЯТЫЙ. Алкогольная потребность.

Появление алкогольной потребности самой по себе, в общем-то, не рассматривается как признак заболевания. Пока её удовлетворение возможно в рамках социально-групповых норм, она не считается патологической. Как только выходит за рамки — считается патологией.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ КРИТЕРИИ

Нарушение сна и аппетита, исчезновение защитного рвотного рефлекса, появление психологических защитных механизмов — всё это не может рассматриваться в качестве решающих диагностических критериев, поскольку часто встречается и при бытовых формах пьянства. Значительные индивидуальные колебания снижают диагностическую ценность и такого вроде бы достоверного симптома, как рост толерантности к алкоголю.

САМОДИАГНОСТИКА

Можно ли самостоятельно оценить, остаются ли Ваши отношения с алкоголем в приемлемых рамках или нужно что-то менять? Можно. В этом может помочь следующий тест. Ответьте на вопросы и посчитайте полученные баллы:

1. Как Вам кажется, Вы пьёте нормально? (под «нормально» имеется в виду, что Вы пьёте меньше или столько же, сколько большинство других). *Ответ «НЕТ» — 2 балла.*

2. Случалось ли Вам проснуться после выпивки и обнаружить, что Вы можете вспомнить только часть вечерних событий? *Ответ «ДА» — 2 балла.*

3. Случалось ли Вашей жене (мужу), родителям или другим близким родственникам высказывать беспокойство по поводу Вашего отношения к алкоголю? *Ответ «ДА» — 1 балл.*

4. Можете ли Вы на вечеринке удовольствоваться только одной-двумя рюмками? *Ответ «НЕТ» — 2 балла.*

5. Случалось ли Вам испытывать чувство стыда из-за своего отношения к спиртному? *Ответ «ДА» — 1 балл.*

6. Как считают Ваши друзья или родственники — Вы пьёте как большинство других людей или больше? *Ответ «БОЛЬШЕ» — 2 балла.*

7. Можете ли Вы прекратить пить, когда захотите? *Ответ «НЕТ» — 2 балла.*

8. Случалось ли Вам посещать собрания анонимных алкоголиков? *Ответ «ДА» — 5 баллов.*

9. Случалось ли Вам, подвыпив, вступать в драку? *Ответ «ДА» — 1 балл.*

10. Случалось ли так, что из-за спиртного у Вас возникали проблемы в отношениях с женой (мужем), родителями или другими близкими родственниками? *Ответ «ДА» — 2 балла.*

11. Случалось ли Вашей жене (мужу), родителям или другим близким родственникам обращаться к кому-либо за помощью в связи с Вашим пьянством? *Ответ «ДА» — 2 балла.*

12. Случалось ли Вам из-за выпивки расставаться с друзьями или подругами? *Ответ «ДА» — 2 балла.*

13. Случались ли у Вас осложнения на работе из-за выпивки? *Ответ «ДА» — 2 балла.*

14. Случалось ли Вам терять работу из-за пьянства? *Ответ «ДА» — 2 балла.*

15. Случалось ли пренебрегать своими обязательствами перед семьей или работой в течение двух или более дней подряд из-за того, что Вы были пьяны? *Ответ «ДА» — 2 балла.*

16. Можно ли сказать, что Вы довольно часто выпиваете до полудня? *Ответ «ДА» — 1 балл.*



17. Предупреждал ли Вас врач, что у Вас проблемы с печенью? Цирроз?
Ответ «Да» – 2 балла.

18. Случалось ли Вам после основного запоя впадать в белую горячку, то есть испытывать сильную дрожь, слышать голоса или видеть то, чего в реальности не существует?
Ответ «Да» – 2 балла.

19. Случалось ли Вам обращаться за помощью по поводу собственного пьянства?
Ответ «Да» – 5 баллов.

20. Случалось ли Вам лежать в больнице из-за пьянства?
Ответ «Да» – 5 баллов.

21. Бывало ли так, что из-за спиртного у Вас возникали проблемы с психикой, и Вас помещали в психиатрическую больницу?
Ответ «Да» – 2 балла.

22. Случалось ли Вам обращаться за помощью к психиатрам или к другим врачам, к священнику или кому-либо ещё из-за обострения эмоциональных проблем под влиянием пьянства?
Ответ «Да» – 2 балла.

23. Случалось ли Вам быть задержанным за управление автомобилем в нетрезвом виде?
Ответ «Да» – 2 балла.

24. Случалось ли Вам попадать под арест (даже на несколько часов) из-за ненадлежащего поведения в нетрезвом виде?
Ответ «Да» – 2 балла.

5 и более баллов, набранных по результатам теста, с достаточно большой вероятностью свидетельствуют о наличии проблем, который требуют консультации с врачом-наркологом.

Конечно, иногда эти же баллы могут набрать и обычные люди, в зависимости от стечения тех или иных обстоятельств. Например, на заседание группы анонимных алкоголиков можно прийти в качестве журналиста или привести своего родственника. В том что они могут бросить пить, когда захотят, уверено подавляющее большинство алкоголиков. Поэтому итоговую оценку результатов всё равно должен проводить врач-нарколог.